

28 CONTRIBUCIONES BREVES.

río Lluta y *B. s. fuscicollis* en Valparaíso, aspecto no tratado por Araya et al. (op. cit.).

A lo anterior se debe agregar su presencia, aunque no documentada, en la localidad de Peine, Segunda Región (Estades 1992).

En la presente nota, se informa de un nuevo avistamiento realizado el 16 de agosto de 1992, en la desembocadura del río Loa, límite entre la Primera y Segunda Región, de un ejemplar asociado a juncales de la ribera del río y del cuál, se lograron tomar fotografías que sirvieron para su correcta identificación.

La coloración de las partes superiores gris azulado y las inferiores gris ceniza, así como la presencia de estrías conspicuas en la región de la nuca y garganta, permitieron identificar al espécimen como la subespecie *Butorides striatus striatus*.

LITERATURA CITADA.

ARAYA, B., G. MILLIE, Y M. BERNAL. 1991. Guía de campo de las aves de Chile. Ed. Universitaria. Santiago.

BLAKE, E. 1977. Manual of Neotropical Birds. Vol. 1. The University of Chicago Press, Chicago.

ESTADES, C. 1992. Avifauna de la segunda región de Antofagasta. Boletín Informativo UNORCH 14: 12-18.

Boletín Chileno de Ornitología 1:28.
Unión de Ornitólogos de Chile 1994

UN NUEVO REGISTRO PARA LA PROVINCIA DE OSORNO, DECIMA REGION.

ENRIQUE COUVE Y CARLOS BRAVO.

Unión de Ornitólogos de Chile, Casilla 637, La Unión.

El día 17 de julio de 1993, se llevó a cabo una reunión, de UNORCH Sur, de preparación del censo de aves acuáticas en la ciudad de Osorno. En dicha oportunidad se realizaron diferentes actividades, destacándose una salida a terreno en la que se visitó un campo en el sector de Huilma, 37 km al suroeste de Osorno.

En esta localidad se observaron 12 especies de aves rapaces, destacando la presencia de Bailarines (*Elanus leucurus*) y el avistamiento de un Halcón Perdiguero (*Falco femoralis*, Temiminck).

Posteriormente, el día 7 de agosto, durante otra salida a terreno realizada por ornitólogos de Osorno y Valdivia, se observó un ejemplar adulto de *Falco femoralis* en el sector de Trumao, 40 km al norte de Osorno.

En los últimos años, la especie ha sido observada por colegas de Temuco y Puerto Montt (Espinosa y von Meyer 1993), por lo cual se sugiere ampliar la distribución de esta especie; aún queda por dilucidar la subespecie de la cual se trataría, por cuanto Goodall et al. (1951) y Araya et al. (1986) establecen que *F. femoralis pichincae* se distribuiría entre Arica y Curicó, mientras que *F. femoralis femoralis* habitaría en la región de Magallanes.

LITERATURA CITADA.

ARAYA, B., G. MILLIE, Y M. BERNAL. 1986. Guía de campo de las aves de Chile. Ed. Universitaria. Santiago.

ESPINOSA, L. Y A. VON MEYER. 1993. Lista patrón de las aves de la Región de los Lagos, Chile. Boletín Informativo UNORCH 15: 27-37.

GODDALL, J.D., A.W. JOHNSON, Y R.A. PHILIPPI. 1951. Las aves de Chile. Vol 2. Platt Establecimientos Gráficos S.A. Buenos Aires.