

OBSERVACION DE GAVIOTIN DE SANDWICH EN IQUIQUE

RONNY PEREDO y NELSON AMADO

Grupo de Estudios Ornitológicos, Dpto. Cs. del Mar, Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique.

El gaviotín de Sandwich (*Sterna sandvicensis* Latham) presenta una población migratoria desde Norteamérica compuesta por la subespecie *S. s. aculavidus* (Blake, 1977; Harrison, 1983).

Durante el invierno boreal llega hasta Argentina por el Atlántico (Canevari et al., 1991; Meyer de Schauensee, 1970), y hasta Perú por la costa pacífica (Blake, 1977; Harrison, 1983). Su presencia en Chile es accidental (Araya et al., 1995) existiendo hasta la fecha los siguientes registros: playa La Lisera en Arica, península de Tumbes en la Región del Bío-Bío (Araya et al., 1986) y Tongoy (Schlatter, 1992).

En esta ocasión comunicamos el avistamiento de un grupo de ejemplares en la península Cavancha, Iquique, durante noviembre de 1992. Los individuos formaban parte de un grupo de gaviotines elegantes *Sterna elegans* y gaviotines árticos *Sterna paradisea*.

El patrón de coloración del plumaje, dimensiones corporales y morfología, resultan ser similares a lo observado en *S. elegans*, lo cual podría dificultar su observación. Sin embargo, el pico negro con la punta amarilla resulta ser el carácter diagnóstico más notorio en terreno; en tanto que las membranas interdigitales amarillas son difícilmente observables a cierta distancia.

LITERATURA CITADA

- ARAYA, B.; G. MILLIE Y M. BERNAL. 1986. Guía de campo de las aves de Chile. Ed. Universitaria, Santiago.
- ARAYA, B.; M. BERNAL; R. SCHLATTER Y M. SALLABERRY. 1995. Lista patrón de las aves de Chile. 3ª edición. Ed. Universitaria, Santiago.
- BLAKE, E. 1977. Manual of neotropical birds. Vol. 1. The University of Chicago Press, Chicago.
- CANEVARI, M.; P. CANEVARI; G.A. CARRIZO; G. HARRIS; J. RODRÍGUEZ Y R.J. STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves de Argentina. Tomo I. Fundación Acindar. Buenos Aires.
- HARRISON, P. 1983. Seabird: an identification guide. Houghton Mifflin Co. Boston, Massachusetts.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1970. A guide to the birds of South America. Livingston Publishing Cop. Wynnewood, Pennsylvania.
- SCHLATTER, R. 1992. Observaciones de aves en el Norte Chico. Boletín Informativo UNORCH 13: 7-8.

ESTIMACION DE LA DENSIDAD DE UNA COMUNIDAD DE AVES DE ESPINAL
MEDIANTE TRANSECTOS Y ESTACIONES PUNTUALES

CRISTIÁN F. ESTADES

Departamento de Manejo de Recursos Forestales, Universidad de Chile, Casilla 9206 Santiago

La determinación del número de aves presentes en un lugar dado es una actividad de gran importancia para un innumerable conjunto de propósitos que van desde su simple conocimiento hasta el eventual manejo de éstas. Los métodos aplicables a esta labor dependerán entonces del tipo de objetivo que se pretenda alcanzar (Bibby et al. 1992). En esta nota se compara la estimación de la densidad de una comunidad de aves de espinal mediante el método de transectos de ancho variable