

## 24 CONTRIBUCIONES BREVES

Boletín Chileno de Ornitología 2:24  
Unión de Ornitólogos de Chile 1995

### REGISTRO DE BENTEVEO BLANCO Y NEGRO *Tyrannus tyrannus* (Linné, 1758) EN CALAMA.

LORENZO DEMETRIO J

Unión de Ornitólogos de Chile. Cucuter 535 Villa San Rafael, Calama.

*Tyrannus tyrannus*, también conocido con el nombre de pitirre americano (Perrins, 1990), es un visitante casual en nuestro país, existiendo registros en las cercanías de Arica, Antofagasta y Santo Domingo (Araya et al., 1986). La especie se reproduce desde el sur de Canadá hasta la costa del golfo de Estados Unidos (Perrins, 1990).

Entre los días 29 de mayo y 27 de junio de 1994, se observó y fotografió un ejemplar solitario del Benteveo Blanco y Negro (*Tyrannus tyrannus*). Este extraordinario viajero presentaba un comportamiento pasivo, tolerando hasta 5 m la presencia humana, siendo su única preocupación atrapar certeramente insectos al vuelo, retornando a la misma percha para engullir su alimento y luego de un breve reposo, volver a seleccionar su presa a la pasada una y otra vez, en una acción que se repetía cada 5 a 10 minutos. El hábitat de preferencia del individuo correspondía a un sector, denominado Las Torpederas, consistente en seis áreas agrícolas abandonadas, abiertas de aproximadamente 3.000 m<sup>2</sup> cada una, demarcada por pimientos (*Schinus molle*) de unos 8 metros de altura en promedio; el sitio se encuentra adyacente al río Loa y a unos 350 m al norte del monumento a la batalla de Topater.

#### LITERATURA CITADA

- ARAYA, B.; MILLIE, G. Y M. BERNAL. 1986. Guía de campo de las aves de Chile. Ed. Universitaria. Santiago.  
PERRINS, C.M. 1990. Enciclopedia ilustrada de las aves. Marshall editios. International Council for Bird Preservation. 1:234-237.

Boletín Chileno de Ornitología 2:24-25,  
Unión de Ornitólogos de Chile 1995

### OBSERVACION DE PEUQUITO (*Accipiter bicolor chilensis*, PHILIPPI Y LANDBECK, 1864) EN EL PARQUE NACIONAL FRAY JORGE, IV REGION.

CHARIF TALA G.<sup>1,2</sup> Y JADILLE MUSSA C.<sup>2</sup>

1 Servicio Agrícola y Ganadero, Avda. Bulnes 140, Santiago.

2 Unión de Ornitólogos de Chile, Casilla 572-11, Santiago.

El conocimiento actual que tenemos sobre la biología del peuquito (*Accipiter bicolor chilensis*) es escaso, restringiéndose casi exclusivamente a antecedentes sobre su distribución en nuestro país. Esta subespecie, considerada actualmente como una especie independiente (*A. chilensis*) por algunos autores (Del Hoyo et al, 1994), habitaría exclusivamente en Chile y Argentina desde las provincia de Aconcagua y Mendoza por el norte hasta Tierra del Fuego por el sur, reportándose desplazamientos hasta la provincia argentina de Tucumán durante el invierno (Araya et al., 1986; Brown y Amadon, 1989; Narosky e Yzurieta, 1987).

El día 24 de marzo de 1995, observamos un ejemplar macho juvenil de peuquito dentro del Parque Nacional Fray Jorge, provincia de Elqui, IV Región. El ejemplar fue observado aperchado sobre la flor seca de un chagual (*Puya sp.*) en un ambiente de matorral bajo, en las inmediaciones del bosque relicto del parque, a una altitud aproximada de 600 msnm; el individuo permaneció en el área durante casi un minuto, para luego perderse en un bosque de olivillos (*Aextoxicon punctatum*) ubicado en una